

MiraLax preparación intestinal para la colonoscopia

(dosis divididas)



COMPRA EN LA FARMACIA:

- 2 tabletas de Dulcolax (Bisacodyl)
- Una botella (238 gramos) de Miralax (polietilenglicol)
- 64 onzas de cualquier líquido claro de su elección (excepto rojo o púrpura). La mayoría de la gente prefiere Gatorade o Crystal Light.

UNA SEMANA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

Informe a su médico si usted está tomando anticoagulantes medicamentos como Coumadin, Plavix, Lovenox, o aspirina.

Lo más probable es que se le pedirá que interrumpir estos medicamentos 3 a 7 días antes de su procedimiento si es aprobado por su médico familiar o cardiólogo.

DOS DÍAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

1. Mezclar la botella de 238 gramos de MiraLax en 64 onzas de líquido claro de su elección como se ha descrito anteriormente.
2. Agitar la solución hasta que el MiraLax se disuelva.
3. Refrigerar.

UN DÍA ANTES DE LA COLONOSCOPIA:

1. **SOLO LIQUIDOS CLAROS PARA EL RESTO DEL DIA!**
2. En ___am/pm tomar 2 tabletas de Dulcolax con 8 onzas de líquido claro.
3. A partir de las ___am/pm tome la mitad de la mezcla líquida de 32 onzas. Esto significa tomar 8 onzas de la solución MiraLax cada 15 minutos hasta que ha bebido 32 onzas. Esta preparación del intestino dura aproximadamente 1 hora.
4. Permanezca cerca de un baño.
5. Asegúrese de mantenerse muy bien hidratado. Tome extra líquidos claros antes de ir a la cama.

EN EL DÍA DE LA COLONOSCOPIA:

1. A partir de las ___ a.m. / p.m. tome el resto de la solución (32 onzas). Esto significa beber 8 onzas de la solución MiraLax cada 15 minutos hasta que esté todo terminado. Esta parte de la preparación del intestino dura aproximadamente 1 hora.
2. **UNA VEZ MÁS , POR FAVOR NO COMER NADA.**
3. **NO TOME NADA 3 HORAS ANTES A SU PROCEDIMIENTO.**
4. Si toma medicamentos, puede tomar (medicamentos para la presión arterial, el corazón, con vulsiones) en el mañana del procedimiento con un pequeño trago de agua.
5. Si usted es diabetico no tome sus medicamentos antidiabeticos orales la mañana del procedimiento . Si usa insulina inyectable use la mitad de la dosis en la mañana. Los procedimientos se cancelan si el nivel de glucosa en la sangre es superior a 300.
6. Informe al centro medico la hora especificada.
7. Es importante tomar todos los medicamentos y líquidos por lo que su médico será capaz de ver todo el colon con claridad.
8. La preparación de la colonoscopia hara que el cuerpo pierda una gran cantidad de líquido. Esto puede causar una enfermedad debido a la pérdida demasiada de líquido.... Esto puede resultar en una enfermedad debido a la pérdida de demasiado líquido corporal (deshidratación). Es importante que prepare su cuerpo bebiendo más líquidos claros antes de la preparación. Manténgase hidratado bebiendo líquidos claros durante la preparación como se le ha dirigido. Reponga su sistema bebiendo líquidos claros despues de la colonoscopia al Volver a su casa.